

Vederlagsfri udlevering af medicin til særlige ikke-indlagte patientgrupper, der er i fortsat sygehusbehandling

Listen har virkning fra den 1. april 2011

Ordningen omfatter udelukkende de i skemaet nævnte patientgrupper og ATC-koder. Herudover skal én eller flere af følgende betingelser være opfyldt:

- A Behov for tæt styring af medicineringen**
En korrekt anvendelse af lægemidlet forudsætter indgående kendskab til patienten samt en omfattende viden om lægemidlet og sygdommen. Denne viden besiddes kun af en specialafdeling. En patient, som lægefagligt kan vurderes som egnet til at blive fulgt fra egen læge eller speciallæge, forudsættes afsluttet til eventuel viderebehandling i primærsektoren.
- B Lægemidler fremstillet specielt til den enkelte patient**
Lægemidler der ikke er standardpræparater og som det vil være unødigt besværligt for patienten at skulle rekvirere fra et privat apotek. Lægemidlerne fremstilles typisk kun på sygehusapoteker.
- C Udlevering i henhold til særlige beslutninger**
Regeringen har i flere tilfælde klargjort, at bestemte lægemidler skal udleveres vederlagsfrit til ikke indlagte patienter. Det drejer sig om:
- 1) Kytril, Zofran, Vogalene og andre kvalmestillende midler, der anvendes til cancerpatienter,
 - 2) Parenteral ernæring til patienter med svært korttarmsyndrom,
 - 3) samtlige udgifter til hjemmedialyse.

- D Lægemidler til ikke-indlagte psykiatriske patienter**
Der kan udleveres antipsykotika vederlagsfrit i en begrænset periode på ca. to år til skizofrene patienter i starten af deres sygdomsforløb samt til psykiatriske patienter med dom til behandling, selv om disse patienter ikke er indlagt. Denne sidstnævnte gruppe af patienter omfatter ud over patienter med skizofreni også patienter med skizoaffektiv sygdom, bipolar sygdom (manio-depressiv lidelse) og få patienter med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder). For behandlingsdømte svarer den tidsmæssige udstrækning for vederlagsfri medicin som udgangspunkt til dommens længde. Udleveringen af vederlagsfri medicin skal begrundes i ét eller flere af følgende behandlingsmæssige hensyn: 1) Medicineringen kræver specifik viden og erfaring fra sygehuset/behandlingspsykiatrien, 2) behov for tæt styring eller stabilisering fra sygehuset/behandlingspsykiatrien eller 3) Hvis manglende compliance er en del af sygdommen, eller hvis manglende compliance medfører risiko for skadelig adfærd på patienten selv eller andre.

Udlevering udover listen

Udover listen kan lægemidler efter lægeligt skøn udleveres til kort tids forbrug efter udskrivning (f.eks. til kvalme- eller smertebehandling) og til færdiggørelse af kortvarende kure (f.eks. antibiotika). Desuden kan sygehuset udlevere lægemidler, der skal indtages indtil behandling kan overgå fra sygehuslæge til praktiserende læge. Der vil endvidere blive udleveret lægemidler, der af Lægemiddelstyrelsen er klassificeret til begrænset udlevering fra sygehus. En opdateret liste over lægemidler med begrænset udleveringsstatus findes på Lægemiddelstyrelsens web-side www.medicinpriser.dk/default.aspx (foretag udvidet søgning, vælg herefter udleveringsgruppe BEGR).

Patientgrupper	ATC-kode	Lægemidler	Særlige betingelser
Cancerpatienter og patienter med maligne hæmatologiske lidelser, (herunder knoglemarvsplanterede)	A 01 AB	Antiinfectiva til lokal brug i mundhulen	Følgevirkning
	A 03 FA	Propulsiva	Følgevirkning
	A 04	Midler mod kvalme	Følgevirkning
	A 07 A	Antiinfektionsmidler til tarmen	Følgevirkning
	A 07 D	Peristaltikhæmmende midler (Antipropulsiva)	Følgevirkning
	B 01 AC	Blodplade-aggregationshæmmere excl. hepariner	Følgevirkning
	B 01 AB	Heparin-gruppen	Følgevirkning
	B 02 AA	Aminosyrer (antifibrinolytika)	Følgevirkning
	B 03 XA	Andre midler mod anæmi	Følgevirkning
	G 03 HA	Antiandrogener, usammensatte	Behandling
	H 01 CB	Antivæksthormoner	Behandling
	H 02	Kortikosteroider til systemisk brug	Følgevirkning
	H 05 BX 01	Cinacalcet	Behandling
	J 02 A	Antimykotika til systemisk brug	Følgevirkning
	J 05 A	Antivirale midler til systemisk brug	Behandling
	L 01	Cytostatika	Behandling
	L 02	Hormonterapi	Behandling
	L 03 A	Immunsystemstimulerende midler	Behandling, følgevirkning
	L 04 A	Immunsuppressiva	Behandling
	M 05 B	Midler mod knoglesygdomme	Behandling
V 03 AF	Afgiftningsmidler ved cytostatikabehandling	Behandling, følgevirkning	
H 01CA 03	Histrelin	Behandling	
Transplanterede patienter (organer og knoglemarv)	A 03 FA	Propulsiva	Følgevirkning
	A 05 AA 02	Ursodeoxycholsyre	Følgevirkning
	H 02	Kortikosteroider til systemisk brug	Behandling
	J 02	Svampemidler til systemisk brug	Behandling
	J 05 A	Antivirale midler til systemisk brug	Følgevirkning
	L 04 A	Immunsuppressiva	Behandling, følgevirkning
	V 03 A	Andre terapeutiske produkter, herunder antidoter	Behandling, følgevirkning
	J 01 EE 01	Sulfamethoxazol og trimethoprim	Behandling

Patientgrupper	ATC-kode	Lægemidler	Særlige betingelser
Tuberkulosepatienter	J 02 J 04 A J 01 AA 01 J 01 MA 14	Svampemidler til systemisk brug Midler mod mycobakterier Ofloxacin Moxifloxacin	Behandling Behandling Behandling Behandling
Hæmofilpatienter	B 02 AA 02 B 02 BD	Tranexamsyre Blodkoagulationsfaktorer	Behandling Behandling
Patienter med nyresvigt	A 02 A A 11 CC A 12 A B 01 B 03 XA B 05 C B 05 D B 05 Z H 05 BX 01 V 03 AE H 05 BX 02	Antacida Vitamin D og analoger Calcium Midler mod blodpropper Andre midler mod anæmi Skyllevæsker Peritonealdialysevæsker Hæmodialysekoncentrater Cinacalcet Midler til behandling af hyperkaliæmi og -fosfatæmi Paricalcitol	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling
Patienter med behov for parenteral ernæring	B 05 BA	Opløsninger til ernæring, parenteral	Behandling
Patienter med immundefekt	J 06 BA	Immunoglobuliner, normal human	Behandling
Patienter inficeret med Clostridium defficile	A 07 AA 09	Vancomycin	Behandling

Patientgrupper	ATC-kode	Lægemidler	Særlige betingelser
Patienter med hypofysesygdom samt patienter med meget lav højde uden væksthormonmangel. Dette inkluderer fx. Turnerpatienter, patienter med skeletdysplasi, nyreinsufficente patienter, patienter med Prader Willi samt Small for Gestational Age (SGA)	G 02 CB 03	Cabergolin	Behandling
	G 02 CB 04	Norprolac	Behandling
	G 03 B	Androgener	Behandling
	G 03 C	Østrogener	Behandling
	G 03 F	Gestagener og østrogener i kombination	Behandling
	G 03 G	Gonadotropin og andre ægløsningsstimulerende midler	Behandling
	H 01 A	Hypofyseforlapshormoner	Behandling
	H 01 BA	Vasopressin og analoger	Behandling
	H 01 CB	Antivæksthormon	Behandling
	H 02	Kortikosteroider til systemisk brug	Behandling
	H 03 AA	Thyreoideahormoner	Behandling
	L 02 AE	Gonadotropinfrigørende hormon analoger	Behandling
	N 04 BC01	Bromokriptin	Behandling
Patienter med HIV/AIDS	A 01 AB	Antiinfectiva til lokal brug i mundhulen	Følgevirkning
	J 01 EC 02	Sulfadiazin	Behandling af paracitære sygdomme
	J 01 EE 01	Sulfametoxazole med trimethoprim	Behandling af paracitære sygdomme
	J 01 FF 01	Clindamycin	Behandling af paracitære sygdomme
	P 01 BD 01	Pyrimethamin	Behandling af paracitære sygdomme
	A 07 A	Antiinfektionsmidler til tarmen	Følgevirkning
	J 02 A	Svampemidler til systemisk brug	Følgevirkning
	J 04 BA 02	Dapsone	Følgevirkning, ikke registreret.
	J 05 A	Antivirale midler til systemisk brug	Behandling
	L 03 A	Immunsystemstimulerende midler	Behandling, følgevirkning
	V 03 A	Andre terapeutiske produkter, herunder antidoter	Behandling, følgevirkning

Patientgrupper	ATC-kode	Lægemidler	Særlige betingelser
<p>Patienter med aktiv bindevævssygdom eller autoimmun sygdom, som p.g.a. sygdommens karakter eller udvikling ikke kan behandles af praktiserende speciallæger eller af alment praktiserende læger</p>	<p>L 01 AA 01 L 01 BA 01 L 04 A</p>	<p>Cyclophosphamid Methotrexate Immunsuppressiva</p>	<p>Behandling Behandling Behandling</p>
<p>Patienter med kronisk viral hepatitis</p>	<p>J 05 A L 03 A</p>	<p>Antivirale midler til systemisk brug Immunsystemstimulerende midler</p>	<p>Behandling Behandling</p>
<p>Patienter med multiresistente stafylokokker</p>	<p>A 07 AA 09 D 06 AX 09 D 10 AF 01 J 01 XC 01 J 01 XX 08 J 01 AA 02 J 04 AB 02</p>	<p>Vancomycin Mupirocin Clindamycin Fusidinsyre Linezolid Doxycyclin Rifampicin</p>	<p>Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling</p>

Patientgrupper	ATC-kode	Lægemidler	Særlige betingelser
Antipsykotika til skizofene patienter i starten af deres sygdomsforløb	N05AB03 N05AE03 N05AE04 N05AF01 N05AF05 N05AH02 N05AH03 N05AH04 N05AL05 N05AX08 N05AX12 N05AX13	Perphenazin Sertindol Ziprasidon Flupentixol Zuclopenthixol Clozapin Olanzapin Quetiapin Amisulprid Risperidon Aripiprazol Paliperidon	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling
Antipsykotika til psykiatriske patienter med dom til behandling	N05AA02 N05AB02 N05AB03 N05AD01 N05AD03 N05AE03 N05AE04 N05AF01 N05AF03 N05AF05 N05AH02 N05AH03 N05AH04 N05AL05 N05AX08 N05AX12 N05AX13	Levomepromazin Fluphenazin Perphenazin Haloperidol Melperon Sertindol Ziprasidon Flupentixol Chlorprothixen Zuclopenthixol Clozapin Olanzapin Quetiapin Amisulprid Risperidon Aripiprazol Paliperidon	Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling Behandling

Patientgrupper	ATC-kode	Lægemidler	Særlige betingelser
<p>Anticholinergika til behandling af ekstrapyramidale bivirkninger (EPS). Ved debuterende skizofreni er vedvarende tilstedeværelse af EPS og dermed anticholinerg behandling uønsket. Vedvarende behandling med anticholinergika kan være nødvendig til ptt med dom til behandling.</p>	<p>N04AA02 N04AA04 N04AB02 A03BA03</p>	<p>Biperiden Procyclidin Orphenadrin Hyoscyamin (til behandling af hypersalivation ved clozapin behandling)</p>	<p>Følgevirkning Følgevirkning Følgevirkning Følgevirkning</p>
<p>Skizofrene patienter i starten af deres sygdomsforløb</p> <p>Betablokker til behandling af den ekstrapyramidale bivirkning akathisi</p>	<p>C07AA05</p>	<p>Propranolol</p>	<p>Følgevirkning</p>
<p>Patienter med dom til behandling</p> <p>Patienter med bipolar affektiv lidelse (manio-depressiv sygdom) Stemningsstabiliserende præparater</p>	<p>N05AN01 N03AF01 N03AF02 N03AG01 N03AX09</p>	<p>Lithium Carbamazepin Oxcarbazepin Valproinsyre Lamotrigin</p>	<p>Følgevirkning Følgevirkning Følgevirkning Følgevirkning Følgevirkning</p>
<p>Patienter med dom til behandling</p> <p>Patienter med ADHD</p>	<p>N06BA09</p>	<p>Atomoxitin</p>	<p>Følgevirkning</p>